

Excedrin Migra Stop *20 tabl.

Cena: 37,98 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,25g+0,25g+0,065g
Opakowanie	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)
Postać	tabl.powl.
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	lek bez recepty
Substancja czynna	Acidum acetylsalic., Paracet., Coffeinum

Opis produktu

Nazwa: Excedrin MigraStop tabletki powlekane

Opakowanie: 20 tabl.

SKład: 1 tabletkę zawiera:

250mg kwasu acetylosalicylowego, 250mg paracetamolu, 65mg kofeiny

Działanie: Excedrin®Migrastop walczy z migreną szybko i kompleksowo.

Zwalcza nie tylko migrenowy ból głowy ale i inne objawy migreny (nudności, nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na dźwięk)

Zaczyna eliminować migrenowy ból i inne objawy migreny już w ciągu 30 minut od zażycia

Excedrin® MigraStop jest skuteczny w walce z migreną menstruacyjną 2- często występującym rodzajem migreny

Usuwa migrenowy ból głowy oraz dodatkowe objawy migreny menstruacyjnej (nudności, dźwiękowstręt, światłowstręt, upośledzenie funkcjonowania)

Excedrin® MigraStop skuteczny również u pacjentów z ciężką migreną (upośledzającą funkcjonowanie) 3

Usuwa SILNY migrenowy ból głowy oraz dodatkowe objawy ciężkiej migreny (ograniczenie zdolności do normalnego wykonywania czynności, dźwiękowstręt, światłowstręt)

Zaczyna eliminować nawet SILNY migrenowy ból głowy w ciągu 30 minut

Wskazania: Stosowany w doraźnym leczeniu bólu głowy oraz napadów migreny z aurą lub bez aury.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. U pacjentów, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak diklofenak czy ibuprofen, powoduje napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa.

Czynny wrzód żołądka lub jelit, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego oraz u pacjentów ze zdiagnozowanym owrzodzeniem żołądka i jelit.

Hemofilia lub inne skazy krwotoczne.

Ciężka niewydolność nerek lub wątroby

Ciężka niewydolność serca

Przyjmowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień

Trzeci trymestr ciąży

Dawkowanie: Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

Ból głowy:

Zazwyczaj zalecaną dawką jest 1 tabletkę. Drugą tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej. W przypadku bardziej nasilonego bólu głowy można przyjąć jednorazowo 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin.

Excedrin MigrStop jest przeznaczony do doraźnego stosowania, maksymalnie do 4 dni w bólu głowy.

Migrena:

Po wystąpieniu objawów należy przyjąć 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin.

Excedrin MigraStop jest przeznaczony do doraźnego stosowania maksymalnie do 3 dni w migrenie.

Zarówno w przypadku bólu głowy jak i migrey nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. Produkt nie powinien być stosowany przez dłuższy okres lub w większych dawkach bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

Lek każdorazowo należy popić szklanką wody.

Status: Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.