Apteka Galen

Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy
ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

Filomag B6 *50 tabl.

Cena: 4,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	40mg+5mg
Opakowanie	50 tabl. (blist.)
Postać	tabl.
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM
Substancja czynna	Magnesium, Pyridoxinum

Opis produktu

Skład: 1 tabletka zawiera:

substancje czynne: 600 mg magnezu wodoroasparaginianu (co odpowiada 40 mg jonów magnezu) oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku
substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, talk, magnezu stearynian
Opis produktu: Filomag® B6 zawiera dobrze przyswajalny związek magnezu (asparaginian) oraz witaminę B6. Magnez korzystnie wpływa na organizm w stanach zmęczenia i osłabienia mięśni. Jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz krążenia. Reguluje pracę serca, bierze udział w procesie skurczu mięśni, zmniejsza napięcie nerwowe, poprawia odporność na stres. Z kolei witamina B6 zwiększa o 20 do 40% wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, ułatwia transport tego pierwiastka do wnętrza komórek i utrzymuje jego właściwe stężenie wewnątrzkomórkowe.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,
hipermagnezemia,
ciężka niewydolność nerek,
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bradykardia, myasthenia gravis.
Działania niepożądane: Jak każdy lek, Filomag B6 może powodować działania niepożądane chociaż nie u każaego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

nudności i biegunka, które zwykle ustępują samoistnie.
Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (np. zmiany rytmu pracy serca),
zaczerwienienie skóry,
osłabienie mięśniowe.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10000 leczonych pacjentów):

bezsenność.

Sposób użycia: Zwykle stosowana dawka dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

leczniczo: 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę;
profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę.
Status: Lek OTC
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny:
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39, 85- 619 Bydgoszcz
tel. 52 342 67 88