

Gaviscon o smaku mięty zawiesina doustna 150ml



Cena: 20,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(0,5g+0,267g+0,16g)/10ml
Opakowanie	150 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	lek bez recepty
Substancja czynna	Natrii alg., Natrii hydrog., Calcii car.

Opis produktu

Skład: 10 ml leku zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia.

Substancje pomocnicze: leku to karbomer 974P, metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat miętowy nr 4, aromat miętowy nr 5 oraz woda oczyszczona.

Działanie: Lek Gaviscon tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Warstwa ta zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia dyskomfortu w gardle i jamie ustnej. Zgaga może pojawiać się po posiłkach (głównie tłustych i ostrych) lub podczas ciąży, lub u pacjentów z objawami zapalenia ściany przełyku (np. trudnościami i (lub) utrudnionym przełykaniem, bólem w jamie ustnej, wymiotami).

Wskazania: odbijanie,

zgaga,

niestrawność,

na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

Przeciwwskazania: Leku Gaviscon nie powinno się przyjmować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik leku.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek Gaviscon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

wysypka skórna, świąd,

trudności w oddychaniu,

zawroty głowy,

obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Uwaga: Lek zawiera sól i wapń.

Produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 st.C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Sposób użycia: Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka leku Gaviscon osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to od 10 - 20 ml w przypadku wystąpienia objawów po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Lek wstrząsnąć przed użyciem.

Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Status: Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.