

Gynauxil globulki dopochwowe *10 glob.



Cena: 39,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 glob.
Postać	glob.dopochw.
Producent	POLSKI LEK DYSTRYBUCJA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Skład: glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylogowany alkohol cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

Opis produktu: Gynauxil to globulki dopochwowe dla kobiet w każdym wieku. Wskazania do stosowania: przywracanie lub utrzymanie właściwego pH (co stwarza warunki hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych), łagodzenie objawów suchości pochwy, wzmacnianie naturalnej flory bakteryjnej pochwy (np. po antybiotykoterapii, po menstruacji, w okresie zaburzonej gospodarki hormonalnej oraz w przypadku stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu pochwy). Przeciwdziałanie stanom atrofii błony śluzowej pochwy.

Pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus, stanowią jedyną florę bakteryjną pochwy, które produkują kwas mlekowy jako końcowy produkt metabolizmu węglowodanów i zakwaszają środowisko pochwy. Bakterie te w warunkach fizjologicznych utrzymują odpowiednio niskie pH pochwy na poziomie 3,5-4,5, stymulują układ odpornościowy oraz hamują namnażanie bakterii chorobotwórczych. Gynauxil zawiera składniki podłoża umożliwiające selektywne namnażanie bakterii Lactobacillus Vaginalis.

Sposób użycia: Kobiety miesiączkujące / w okresie rozrodczym: Zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez pięć kolejnych dni, począwszy od 1-go dnia po zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do 3 następujących po sobie cyklach menstruacyjnych lub do czasu uzyskania poprawy. Lekarz może zalecić odmienny sposób użycia, do którego należy się dostosować.

Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: Zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez 10 kolejnych dni lub według wskazań lekarza. Należy zrobić około 2-tygodniową przerwę, po której można wznowić stosowanie. Jeśli pojawi się miesiączka, stosowanie należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użycia.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Status: Wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek

niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.