

Iberogast płyn 20 ml



Cena: 36,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 ml (butelka)
Postać	płyn doustny
Producent	STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Iberogast płyn

Opakowanie: 20ml

Skład: 100ml płynu zawiera: 15 ml wyciągu z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5; ekstrahent - etanol 50% v/v), 10ml wyciągu z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 20ml wyciągu z kwiatów rumianku (1:2-4; ekstrahent - etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z owoców kminku (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z owoców ostropestu plamistego (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z liści melisy (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 5ml wyciągu z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z ziela glistnika (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v). Iberogast zawiera 29,5-32,6% (v/v) etanolu.

Wskazania: w chorobach żołądka i jelit związanych z zaburzeniami w ruchach perystaltycznych i w wydzielaniu soków trawiennych. Preparat wskazany jest w: skurczach żołądka i jelit, zespole jelita drażliwego, podrażnieniu żołądka, stanach zapalnych błony śluzowej żołądka.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu. Dzieci poniżej 6 lat.

Działanie: przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne, zmniejsza uczucie pełności, osłabia skurcze żołądka i jelit, hamuje wydzielanie soku żołądkowego.

Sposób użycia: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmuje się w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia 3 razy dziennie po 20 kropli, dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli.

Status: Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.