

# Miramile Tonsil spray 30 ml



Cena: 23,60 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	spray
Producent	VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Nazwa:** Miramile Tonsil spray

**Opakowanie:** 30ml

**Skład:** olejek z balsamowca mirry, olejek z rokitnika zwyczajnego, olejek z nagietka, olejek z pomarańczy słodkiej, olejek z gorzkich migdałów, olejek eteryczny z tymianku, olejek mięty pieprzowej, olej rzepakowy

**Działanie:** Zawarta w Miramile® Tonsil mieszanka olejków roślinnych (olejek z rokitnika zwyczajnego) tworzy na śluzówce błonę ochronną, pozwalającą utrzymać integralność błony śluzowej przez ochronę przed zewnętrznymi szkodliwymi czynnikami i patogenami. Działanie nawilżające i zmiękczające (olejek z balsamowca mirry, olejek z nagietka) pozwala ukoić podrażnioną błonę śluzową i łagodzi objawy zapalenia (suchość, drapanie w gardle, ból gardła, problemy z połykaniem, chrypka, uczucie ciała obcego w gardle, itp.). Olejki eteryczne zawarte w Miramile® Tonsil dodano, aby nadać zapach i poprawić smak preparatu.

**Wskazania:** Miramile® Tonsil spray do jamy ustnej i gardła jest stosowany:

- pomocniczo w zapalenia gardła i chrypki (np. zapalenie gardła, przeziębienie, angina, zapalenie krtani, zapalenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł)
  - w celu łagodzenia objawów takich jak: suchość, drapanie w gardle, problemy z połykaniem, uczucie ciała obcego w gardle, itp.
  - w celu zmniejszenie obrzęku śluzówki
  - do ochrony przy podrażnieniu jamy ustnej lub gardła przed działaniem zewnętrznych szkodliwych czynników i patogenów
  - do nawilżenia śluzówki gardła i przełyku
- Dawkowanie:** Stosować do jamy ustnej i gardła. U osób dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat.

Stosować 2 – 3 razy dziennie po kilka dawek rozpylanych.

**Przeciwwskazania:** Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik produktu.

Nie zaleca się stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Chronić przed kontaktem z oczami.

Produkt może pozostawić plamy, jeśli został rozpylony na ubranie.

W razie wystąpienia działania niepożądanego, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Dzieci mogą stosować spray wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Jeżeli objawy nie mijają, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku uszkodzenia opakowania, znajdującego się w nim produktu nie można stosować.

**Status:** Wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.