

## Normosan fix \*20 sasz.



Cena: 9,50 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 sasz.
Postać	zioła do zaparz.w saszet.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	lek bez recepty
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Skład:** 1 saszetka 1,4 g zawiera:

Kora kruszyny - 0,280 g

Liść senesu - 0,140 g

Owoc kminku - 0,490 g

Owoc bzu czarnego - 0,252 g

Liść mięty pieprzowej - 0,238 g.

1 saszetka 1,4 g zawiera 19,6 – 29,4 g antrachinonów w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

**Opis produktu:** Napar z mieszanki stosuje się jako środek przeczyszczający w zaparciach.

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na kruszynę, senes lub którykolwiek składnik produktu.

Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha nieznanego pochodzenia, niewydolność nerek, krwawienia miesiączkowe, odwodnienie organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej (głównie hipokaliemia).

**Działania niepożądane:** Bardzo rzadko u osób z nadwrażliwością mogą wystąpić: świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka. W bardzo rzadkich przypadkach kora kruszyny i liście senesu mogą powodować skurczowe bóle w obrębie jamy brzusznej oraz wodnisty stolec, w szczególności u pacjentów z zespołem nadpobudliwego jelita. Symptomy te często są wynikiem przedawkowania leku i w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę.

Długotrwałe stosowanie / uzależnienie może prowadzić do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Biegunka prowadzić może w szczególności do utraty potasu co w konsekwencji może powodować zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśniowe, w szczególności jeśli pacjent równocześnie stosuje glikozydy nasercowe, diuretyki, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji.

Zbyt długie stosowanie preparatu może spowodować odwracalne zmiany pigmentacyjne w błonie śluzowej jelita grubego, może wystąpić także białkomocz i krwiomocz.

**Sposób użycia:** Maksymalna dzienna dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka odpowiadająca 1 saszetce produktu leczniczego.

1 saszetkę zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać przez ok. 15 minut. Przed udaniem się na spoczynek: wypić jednorazowo od 2/3 do

całości przygotowanego naparu. Działanie przeczyszczające występuje przeciętnie po 6 – 10 godzinach. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca. Przy pierwszym stosowaniu najlepiej wypić 2/3 szklanki naparu. Jeżeli efekt terapeutyczny nie wystąpi można następnym razem (nie wcześniej, niż po upływie doby ) zwiększyć dawkę do całej szklanki naparu. Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż przez 7 – 10 dni (najlepiej nie stosować częściej niż 2 – 3 razy w tygodniu).

**Status:** Ziołowy produkt leczniczy bez recepty

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.