

Nurofen Forte od 3m-ca życia smak truskawkowy 100ml



Cena: 34,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Nazwa: Nurofen Forte zawiesina dla dzieci 200mg/5ml smak truskawkowy

Opakowanie: 100 ml

Sposób użycia: Niemowlęta od 3-6 miesięcy (5-7,6 kg) 3 razy po 1,25 ml w ciągu doby.

Niemowlęta 6-12 miesięcy(7,7-9 kg) 3 do 4 razy po 1,25 ml w ciągu doby.

Dzieci 1-3 lat (10-15 kg) 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby.

Dzieci 4-6 lat (16-20 kg) 3 razy po 3,75 ml.

Dzieci 7-9 lat (21-29 kg) 3 razy po 5 ml.

Dzieci 10-12 lat (30-40 kg) 3 razy po 7,5 ml.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat 3 razy po 10 ml w ciągu doby.

Skład: 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze.

Wskazania: Lek Nurofen dla dzieci Forte jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących przypadkach:

- gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego),

- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwężenia, skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub substancje pomocnicze oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;

objawy alergii w postaci kataru; pokrzywki lub astmy oskrzelowej po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,

z ciężką niewydolnością wątroby;

ciężka niewydolność nerek lub serca,

jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2,
III trymestr ciąży,
skaza krwotoczna.

Działania niepożądane: Zaburzenia jelit i żołądka:

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności

Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka

Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwawe wymioty, zapalenie jamy ustnej wrzodziejące, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: bóle głowy

Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, w pojedynczych przypadkach opisywano depresję, reakcje psychotyczne i szумы uszne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: obrzęki

Bardzo rzadko: zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi

Zaburzenia skóry:

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno - rozplywna naskórka

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: pokrzywka i świąd

Bardzo rzadko: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, zaostrzenia astmy i skurcz oskrzeli

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związana ze stosowaniem NLPZ w dużych dawkach

Uwagi: Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.