

Vicks AntiGrip Complex *10 sasz.

Cena: 20,98 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,5g+0,2g+0,01g
Opakowanie	10 sasz.
Postać	pr.do p.rozt.doust.
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Rejestracja	lek bez recepty
Substancja czynna	Paracetamol, Guaifenesi, Phenyleph.hydr.

Opis produktu

Nazwa: Vicks SymptoMed Complete Cytryna, proszek do sporządzania roztworu

Opakowanie: 10 saszetek

Sposób użycia: Lek ma postać proszku do rozpuszczania w wodzie do picia w postaci gorącego napoju. Wsypać jedną saszetkę proszku do kubka i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej się do picia.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby. Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby. Nie zaleca się długoterminowego stosowania leku.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, skonsultować się z lekarzem.

Skład: 1 saszetka zawiera:

paracetamol 500mg, gwajafenezyna 200mg, fenylefryny chlorowodorek 10mg

sacharoza kwas cytrynowy, kwas winowy, sodu cyklaminian, sodu cytrynian aspartam, acesulfam potasowy, mentol w proszku aromat cytrynowy, aromat soku cytrynowego, żółcień chinolinowa.

Wskazania: Proszek do sporządzania roztworu doustnego przeznaczony do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy takich jak:

ból głowy

ból ciała

ból gardła

gorączka

przekrwienie nosa

kaszel z odskztuszeniem

Przeciwwskazania: jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku

jeśli u pacjenta występuje choroba serca

jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)

jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub ciężka choroba nerek
jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy
jeśli pacjent jest cukrzykiem
jeśli pacjent ma jaskrę (podwyższone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania
jeśli pacjent cierpi na porfirię, która stanowi wrodzone zaburzenie charakteryzujące się nadmierną zawartością pigmentów w moczu
jeśli pacjent stosuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
jeśli pacjent stosuje leki beta-adrenolityczne
jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) – stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona lub stosował je w ciągu ostatnich 14 dni
jeśli pacjent stosuje leki obniżające ciśnienie krwi lub przeciw dławicy piersiowej nie podawać leku Vicks SymptoMed Complete dzieciom w wieku poniżej 12 latnie zaleca się stosowania leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy podczas ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane: W przypadku stosowania paracetamolu bardzo rzadko mogą występować zaburzenia krwinek i zapalenie trzustki.

Rzadko mogą występować reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne lub pokrzywka), ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja), świszczący oddech lub problemy z oddychaniem.

Informowano o rzadkich przypadkach wystąpienia bólu głowy, zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak ból żołądka, nudności, wymioty i biegunka.

W rzadkich przypadkach fenylefryna może powodować przyspieszone bicie serca (kołatanie serca). W rzadkich przypadkach może także wystąpić wzrost ciśnienia krwi z towarzyszącym mu bólem głowy, zawrotami głowy i kołataniem serca.

Fenylefryna może także powodować problemy ze snem (bezsenność), nerwowość, drżenia, pobudliwość, niepokój, dezorientację i lęk.

Częstymi działaniami fenylefryny są utrata apetytu, nudności i wymioty.

Status: Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.